# Vademécum 2018

# Animales de Compañía

ecuphar®

# Índice


| | |
|---|---|
| Anestésicos | 3 |
| Sedantes | 4 |
| Analgésicos | 4 |
| Etología | 5 |
| Antiinflamatorios | 5 |
| Antiparasitarios internos | 6-7 |
| Leishmaniosis | 7 |
| Antiparasitarios externos | 8-9 |
| Endocrinología y reproducción | 9 |
| Eutanásicos | 9 |
| Antibióticos | 10 |
| Antifúngicos | 10 |
| Óticos | 11 |
| Cardiología | 12 |
| Dermatología | 12-13 |
| Sistema Nervioso | 14 |
| Prevención y tratamiento de las hemorragias | 14 |
| Biológicos | 15 |
| Higiene Bucal | 16 |
| Condroprotectores | 16 |




# Anestésicos

## SevoFlo®

- Sevoflurano.
- Anestésico inhalatorio.
- Administrarse utilizando vaporizador 0 - 8%.
- Vía inhalatoria.
- Frasco de 250 ml.
- Reg: EU/2/02/035/007.

## IsoFlo®

- Isoflurano.
- Anestésico inhalatorio.
- Administrarse utilizando vaporizador 0 - 5%.
- Vía inhalatoria.
- Frasco de 250 ml.
- Reg: 1385 ESP.



## Propovet® Multidosis

- Propofol 10 mg/ml. Alcohol bencílico 2% (E1519).
- Anestésico general intravenoso de acción corta con un periodo de recuperación corto. 1. Anestésico general intravenoso de corta acción para intervenciones de corta duración, de hasta 5 minutos. 2. Para la inducción y mantenimiento de la anestesia general utilizando dosis progresivas hasta conseguir el efecto deseado. 3. Para la inducción de la anestesia donde el mantenimiento se realiza con anestésicos inhalatorios.
- Dosis:
  Perros: 6'5 - 4 - 1 mg/Kg (según premedicación).
  Gatos: 8 - 6 - 1'2 mg/Kg (según premedicación).
- Vía endovenosa.
- 5 viales de 20 ml.
- Reg: 2573 ESP.

# Sedantes

## Dexdomitor®

- Hidrocloruro de dexmedetomidina 0,5 mg/ml.
- Procesos y exploraciones no invasivos y con grado de dolor de ligero a moderado que requieran inmovilización, sedación y analgesia en perros y gatos. Sedación y analgesia profunda en perros en uso concomitante con butorfanol para procedimientos médicos y quirúrgicos menores. Premedicación en perros y gatos antes de la inducción y el mantenimiento de la anestesia general.
- Dosis dependientes de las diferentes combinaciones anestésicas y el efecto deseado.
- Perros: vía IV o IM. Gatos: vía IM.
- Vial de 10 ml.
- Reg: EU/2/02/003/001-002.

## Domtor®

- Medetomidina clorhidrato 1,0 mg/ml.
- Perros: como tranquilizante o sedante con propiedades analgésicas; para su uso en exámenes clínicos, cirugía menor y preanestesia.
- Gatos: como tranquilizante y sedante. En combinación con ketamina para la inducción de la anestesia general, previa a cirugía.
- Perros: vía IM, IV o SC. Gatos: vía IM o SC.
- Vial de 10 ml.
- Reg: 933 ESP.

## Antisedan®

- Atipamezol (clorhidrato) 5 mg/ml.
- Reversión de los efectos sedantes producidos por la medetomidina o la dexmedetomidina en perros y gatos; para contrarrestar posibles casos de sobredosificación de medetomidina.
- Dosis:
  Perros: la dosis de atipamezol a emplear equivale al mismo volumen empleado de medetomidina a 1 mg/ml o dexmedetomidina a 0,5 mg/ml; o bien a 1/5 del volumen empleado de dexmedetomidina a 0,1 mg/ml.
  Gatos: la dosis de atipamezol a emplear equivale a 1/2 del volumen empleado de medetomidina a 1 mg/ml o dexmedetomidina a 0,5 mg/ml; o bien a 1/10 del volumen empleado de dexmedetomidina a 0,1 mg/ml.
- Vía IM.
- Vial de 10 ml.
- Reg: 976 ESP.

# Analgésicos

## Torphasol®

- Butorfanol 4 mg/ml.
- Para el alivio del dolor visceral leve a moderado. Como sedante: en combinación con dexmedetomidina o medetomidina (perros); Analgesia suave (perros) o analgesia suave/moderada (gatos).
- Vía IV o IM.
- Dosis:
  Perros: Analgesia: butorfanol IV a 0,2-0,4 mg/kg (equivalente a 0,05-0,1 ml/kg de Torphasol). Analgesia postoperatoria: butorfanol IV 0,2-0,4 mg/kg de 20 minutos antes de la finalización de la cirugía. Sedación en combinación con dexmedetomidina o medetomidina: butorfanol IV a 0,1-0,2 mg/kg (equivalente a 0,025-0,05 ml/kg de Torphasol) con medetomidina a 10-30 µg/kg de peso corporal, dependiendo del grado de sedación necesario.
  Gatos: butorfanol IV a 0,1-0,2 mg/kg (equivalente a 0,025-0,05 ml/kg de Torphasol).
- 1 Vial de 10 ml.
- Reg: 2147 ESP.

# Etología

## Sileo®

- Hidrocloruro de dexmedetomidina 0,1 mg/ml.
- Gel bucal.
- Alivio del miedo y la ansiedad aguda asociados con el ruido en perros.
- Ver tabla de dosificación según peso en el prospecto.
- Jeringa con 3 ml.
- Vía mucosa bucal.
- Reg: 2/15/181/001/005.

# Antiinflamatorios

## Rheumocam® inyectable

- Meloxicam 5 mg/ml.
- Perros: Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos.
  Reducción de la inflamación y del dolor postoperatorio tras cirugía ortopédica y de tejidos blandos.
- Gatos: Reducción del dolor postoperatorio después de ovariohisterectomía o cirugía menor de tejidos blandos.
- Dosis:
  Perros: Inyección SC o IV única de una dosis de 0,2 mg/ kg (equivalente a 0,4 ml/10 kg).
  Gatos: Inyección SC a dosis de 0,3 mg/ kg (equivalente a 0,06 ml/kg).
- Solución inyectable. Perros: IV o SC. Gatos: SC
- Vial de 10 ml.
- Reg: EU/2/07/078/015.

## Canidryl® palatable

- Carprofeno (comprimidos palatables).
- Reducción de la inflamación y el dolor causados por trastornos musculoesqueléticos y enfermedad articular degenerativa.
  Como continuación de la analgesia parenteral en el control del dolor posquirúrgico.
- Dosis: 4 mg/kg/24 h o 2 mg/kg/12 h.
  20 mg: 1 compr. por 10 kg de peso cada 12 h
  50 mg: 1 compr. por 25 kg de peso cada 12 h
  100 mg: 1 compr. por 50 kg de peso cada 12 h
- Vía oral.
- Envases de 140 comprimidos.
  Caja de 14 blísteres con 10 comprimidos/blister, divisibles en mitades.
- Registro:
  20 mg Reg: 1743 ESP.
  50 mg Reg: 1744 ESP.
  100 mg Reg: 1745 ESP.

# Antiparasitarios internos

## Prazitel®

- Cada comprimido contiene:
  Praziquantel 50 mg
  Pirantel 50 mg (el equivalente a 144 mg de embonato de pirantel)
  Febantel 150 mg
- Tratamiento de infestaciones mixtas por nematodos y cestodos de las especies siguientes:
  **Nematodos:**
  **Ascáridos:** Toxocara canis, Toxascaris leonina (adultos y formas inmaduras avanzadas).
  **Anquilostomas:** Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adultos)
  **Tricuros:** Trichuris vulpis (adultos)
  **Cestodos:**
  **Tenias:** Echinococcus spp., (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp., (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (adultos y formas inmaduras).
- Dosis: 1 comprimido/10 kg.
- Vía oral.
- Cajas de 4 y 104 comprimidos
- Reg: 2180 ESP.

## Prazitel® perros grandes

- Cada comprimido contiene:
  Praziquantel 175 mg
  Pirantel 175 mg (equiv. a 504 mg de embonato de Pirantel)
  Febantel 525 mg
- Perros adultos: Tratamiento de infestaciones mixtas por nematodos y cestodos
- Dosis: 1 comprimido/ 35 kg.
- Vía oral
- Envases de 2 y 20 comprimidos, en blíster, divisibles en mitades.
- Reg: 2702 ESP

## Prazitel® Gatos

- Cada comprimido contiene:
  Embonato de pirantel 230 mg y praziquantel 20 mg.
- Gatos: Tratamiento de infestaciones mixtas causadas por los siguientes nematodos y cestodos gastrointestinales
- Dosis: 1 comprimido/ 4 kg.
- Vía oral
- Envases de 24 comprimidos, en blister, divisibles en mitades.
- Reg: 3047 ESP

## Flubenol®

- Flubendazol 44 mg/ml.
- Nematodosis (Ascáridos, Tricocéfalos y Anquilostomas) y Teniasis.
- Dosis: 22 mg/kg y día = 0,5ml/1 kg/día (Áscaris y Ancylostomas: 2 días; Tricuros y Tenias: 3 días).
- Vía oral.
- Jeringa con 9 ml.
- Reg: 1004 ESP.

# Antiparasitarios internos

## Telmin® Unidía 5 Kg

- Mebendazol 100 mg/compr.
- Nematodosis (Ascaridos, Tricocéfalos y Anquilostomas) y Teniasis.
- Dosis: 20 mg/kg/ día = 1 comprimido/ 5 kg/ día (nematodos: 3 días, y cestodos: 5 días).
- Vía oral.
- Caja de 5 comprimidos.
- Reg: 0474 ESP.

## Telmin® Unidía 10 Kg

- Mebendazol 200 mg/compr.
- Nematodosis (Ascáridos, Tricocéfalos y Anquilostomas) y Teniasis.
- Dosis: 20 mg/kg/ día = 1 comprimido/ 10 kg/ día (nematodos: 3 días, y cestodos: 5 días).
- Vía oral.
- Caja de 5 comprimidos.
- Reg: 0687 ESP.

## Telmin® Unidía 20 Kg

- Mebendazol 200 mg/compr.
- Nematodosis (Ascaridos, Tricocéfalos y Anquilostomas) y Teniasis
- Dosis: 20 mg/kg/ día= 2 comprimidos/ 20 kg/ día (nematodos: 3 días, y cestodos: 5 días).
- Vía oral
- Caja de 10 comprimidos
- Reg: 0687 ESP

## Telmin® Unidía suspensión oral

- Mebendazol 20 mg.
- Perros, gatos, y animales exóticos: hurones, conejos, roedores, aves ornamentales y reptiles.
- Nematodosis (Ascáridos, Tricocéfalos y Anquilostomas) y Teniasis.
- Dosis:
  Perros y gatos: 20 mg/kg/ día = 1 ml/ kg/ día (nematodos: 3 días, y cestodos: 5 días). Para dosificación en exóticos: ver prospecto.
- Vía oral.
- Frasco con 50 ml.
- Reg: 0285 ESP.

# Leishmaniosis

## Leisguard®

- Domperidona 5 mg/ml.
- Perros.
- Reducción del riesgo de desarrollar una infección activa de leishmaniosis y la enfermedad clínica en caso de contacto con Leishmania infantum, mediante la estimulación de la inmunidad celular específica. Control de la progresión de la leishmaniosis canina en las primeras fases de la enfermedad.
- Dosis: 0'5 mg Domperidona/kg/día, equivalentes a 1 ml de Leisguard®/10 kg, una vez al día, durante 4 semanas consecutivas.
- Suspensión oral.
- Envase de 60 ml.
- Reg: 2383 ESP.

## Leiscan® Leishmania ELISA Test

- Detección y cuantificación de anticuerpos específicos frente a Leishmania en suero de perro mediante test ELISA indirecto.
- Presentaciones de 32 y 96x2 (192) determinaciones.
- Reg: 0674-RD.

# Antiparasitarios externos

## Advantage®

- Imidacloprid.
- Para la prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas en perros y gatos y piojos masticadores en el perro.
- Aplicar la pipeta cada 4 semanas en perro y gato.
- Pipeta spot-on.
- 2 presentaciones para gatos y 4 presentaciones para perros.
- Dosis y registro:
  40 mg Gatos Reg: 1179 ESP (<4 kg)
  80 mg Gatos Reg: 1180 ESP (≥4 kg)
  40 mg Perros Reg: 1181 ESP (<4 kg)
  100 mg Perros Reg: 1182 ESP (≥4 a <10 kg)
  250 mg Perros Reg: 1183 ESP (≥10 a <25 kg)
  400 mg Perros Reg: 1270 ESP (≥25 a <40 kg)

## Kiltix®

- Propoxur 10 g, Flumetrina 2,25 g.
- Para el control de garrapatas (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) y pulgas (Ctenocephalides canis/felis) en el perro.
- Pequeño: 1 collar cada 6 meses. Mediano y grande: 1 collar cada 7 meses.
- Collares de 38, 53 y 70 cm.
- Reg: 1170 ESP.

## Maxickade®

- Tetrametrina y Butóxido de piperonilo
- Solución para pulverización cutánea (aerosol)
- Tratamiento y prevención de ectoparasitosis (pulgas, garrapatas, piojos, mosquitos y ácaros) en los perros
- Pulsar sobre el cuerpo del animal a contrapelo y a unos 30-40 cm. durante unos segundos. Repetir cada 5-7 días.
- Vía tópica
- Envase a presión de 400 cc
- Reg: 3300 ESP

## Urtinol® Aerosol

- Deltametrina, Etofenprox y butóxido de piperonilo.
- Para el tratamiento ambiental de plagas/infestaciones
- Un recipiente (aerosol presurizado) sirve para tratar unos 35 m2 .
- Descarga multiusos.
- Envase de 400 ml.
- Reg: 12-30-06289.

## Urtinol® Fogger

- Deltametrina, Etofenprox y butóxido de piperonilo.
- Para el tratamiento ambiental de plagas/ infestaciones
- Los fumigadores de 100 ml sirven para tratar espacios cerrados de 50-80 m3 (equivalente a unos 20-30 m2).
- Aplicación mediante descarga total.
- Fumigadores de 100 ml.
- Reg: 12-30-06276.

## Zeronil®

- Fipronilo
- Tratamiento de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp.*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus y Ixodes ricinus*).
- 1 pipeta
- Pipeta *spot-on*.
- Envases de 3 y 30 pipetas
- Dosis y registro:
  50 mg Reg: 2615 ESP (gatos)
  67 mg Reg: 2611 ESP (perros ≥ 2 a < 10 kg)
  134 mg Reg: 2612 ESP (perros ≥ 10 a < 20 kg)
  268 mg Reg: 2613 ESP (perros ≥ 20 a < 40 kg)

# Antiparasitarios externos

## Fyperix® Combo

- Fipronilo + (S)-Metopreno.
- Infestaciones por pulgas, garrapatas y piojos picadores. Parte del control de la DAPP.
- Perros: 1 pipeta/2 meses. Gatos y hurones: 1 pipeta/mes.
- Solución spot-on, vía ópica.
- Cajas de 3 y 30 pipetas.
- Reg: - 50 mg/60 mg: 3442 ESP
  - 67 mg/60,3 mg: 3443 ESP
  - 134 mg/120,6 mg: 3444 ESP
  - 268 mg/241,2 mg: 3445 ESP
  - 402 mg/361,8 mg: 3446 ESP

# Endocrinología y reproducción

## Lactovet®

- Cabergolina 50 µg/ml.
- Especies de destino: perras.
- Tratamiento de la pseudogestación y supresión de la lactación en las perras, en las siguientes situaciones:
  - Separación de las crías inmediatamente después del parto.
  - Destete precoz.
  - Muerte fetal y/o aborto al final de la gestación.
  - Lactación después de ovariohisterectomía.
- Vía Oral.
- Dosis: 0,1 ml/kg (5 µg de cabergolina/kg/dia) durante 4-6 días consecutivos, según el cuadro clínico. Razas pequeñas/animales que pesan menos de 5 kg: se aconseja administrar la dosis en gotas: 0,1 ml de solución equivalente a 3 gotas. En caso de recaída, se puede tratar nuevamente según la dosis indicada previamente.
- Frasco con 3 ml + cuentagotas de 1 ml (perras hasta 5 kg).
- Frasco con 7 ml + cuentagotas de 1 ml (perras de 5 a 15 kg).
- Frasco con 15 ml + cuentagotas de 1 ml (perras de 15 a 30 Kg).
- Frasco con 24 ml + cuentagotas de 1 ml (perras de >30 Kg).
- Reg: 2071 ESP

# Eutanásicos

## Euthasol®

- Pentobarbital sódico 400 mg/ml.
- Eutanasia.
- Vía IV. (Opcionalmente bajo sedación profunda: vía intracardíaca, y también vía intraperitoneal en animales de pequeño tamaño).
- Dosis: 0,35 ml/kg.
- Viales de 100 o 250 ml.
- Reg: 2455 ESP.



# Antibióticos

## Clavubactin®

- Amoxicilina / Ac. Clávulánico
- Comprimidos saborizados smart-tab divisibles en 2 o 4 partes iguales
- Tratamiento de infecciones en gatos y perros causadas por bacterias sensibles a la combinación, en especial: cutáneas, urinarias, respiratorias, digestivas y bucales
- Dosis: 12'5 mg/kg/12 h
  50 / 12,5 mg: 1 compr. por cada 5 kg de peso /12 h (perro y gato)
  250 / 62,5 mg: 1 compr. por cada 25 kg de peso /12 h (perro).
  500 / 125 mg: 1 compr. por cada 50 kg de peso /12 h (perro).
- Vía oral
- Envases de 100 y de 10 comprimidos (10 compr / blíster)
- Registro:
  50 / 12'5 mg: Reg: 2221 ESP
  250 / 62'5 mg: Reg: 2222 ESP
  500 / 125 mg: Reg: 2223 ESP

## Kefavet®

- Cefalexina 250 y 500 mg.
- Antibiótico de amplio espectro indicado en infecciones cutáneas y de vías urinarias.
- Dosis:
  Infecciones cutáneas: 25-30 mg/kg 2 veces al día.
  Infecciones urogenitales: 15 mg/kg 2 veces al día.
- Vía oral.
- Envases de 140 comprimidos, con 10 blísteres de 14 compr/blíster.
- Registro:
  250 mg Reg: 1823 ESP
  500 mg Reg: 1824 ESP

## Alsir® 2,5% inyec.

- Enrofloxacina 25 mg/ml.
- Antibiótico de amplio espectro con acción antimicoplásmica.
- Dosis: 5 mg/ kg/ día (equiv. a 0'2 ml/ kg/ día)
- Vía SC o IM.
- Caja con 5 viales de 20 ml.
- Reg: 0900 ESP.

# Antifúngicos

## Itrafungol®

- Itraconazol 10 mg/ml.
- Tratamiento de la dermatofitosis en gatos (*Microsporum canis*)
- Dosis: 0,5 ml/kg/día durante 3 períodos alternantes de 7 días.
- Vía oral.
- Frasco 52 ml.
- Reg: 1593 ESP.

## Imaverol®

- Enilconazol 100 mg/ml.
- Tiña causada por los géneros *Trichophyton* y/o *Microsporum*
- Dosis: 20 ml/litro agua. Aplicar la dilución 3-4 veces con intervalos de 3 a 4 días.
- Vía tópica, mediante pulverización o "toques".
- Frasco 100 ml.
- Reg: 0225 ESP.

# Óticos

## Conofite®

- Polimixina B, Miconazol y Prednisolona.
- Antibacteriano, antifúngico, antiinflamatorio esteroide y acaricida en suspensión ótica.
- Dosis: 3 a 5 gotas/oído, dos veces al día durante 15-21 días.
- Gotas, vía ótica.
- Envase cuentagotas con 20 ml.
- Reg: 2347 ESP.

## Marbodex®

- Marbofloxacino, Clotrimazol y Dexametasona.
- Antibacteriano, antifungico, antiinflamatorio esteroide en suspensión ótica.
- Especie: perros.
- Dosis: 10 gotas en el oído una vez al día durante 7 a 14 días.
- Gotas, vía ótica.
- Envase cuentagotas con 20 ml.
- Reg: 3296 ESP.

## Recicort®

- Acetónido de triamcinolona, Ácido salicílico y Etanol.
- Otitis externa. Tratamiento sintomático de la dermatitis seborreica del pabellón auricular.
- Dosis: 8-10 gotas, 1-2 veces al día, máx.14 días.
- Solución vía ótica.
- Envase cuentagotas con 20 ml.
- Reg: 3521 ESP.

## Otimectin®

- Ivermectina 1 mg/g.
- Tratamiento de la otitis producida por el ácaro Otodectes cynotis en gatos.
- Dosis: Un gramo en cada oído. Repetir la administración a los 7 y 14 días.
- Gel, vía ótica.
- Tubo de 10 g.
- Reg: 2687 ESP.

## Otoclean®

- Ác. Láctico, Ac. Salicílico, Ac. Oleico, extractos de plantas,...
- Limpiador ótico indicado en prevención de otitis / higiene auricular / coadyuvante a tratamiento de otitis.
- Dosis: 1 aplicación semanal / 1 aplicación diaria durante 1 semana mientras dure el tratamiento de la otitis.
- Solución, vía ótica.
- Estuche con 18 frascos de 5 ml.
- Reg: 9498.

# Cardiología

## Pimosure® sabor

- Pimobendano (comprimidos snap-tabs palatables).
- Para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina derivada de una insuficiencia valvular (regurgitación mitral y/o tricúspide) o cardiomiopatía dilatada.
- Dosis: 0'25 mg/kg/12 h.
  1'25 mg: 1 compr. por 5 kg de peso cada 12 h
  2'5 mg: 1 compr. por 10 kg de peso cada 12 h
  5 mg: 1 compr. por 20 kg de peso cada 12 h
- Vía oral.
- Envases de 100 comprimidos de 1'25 mg, (div. en mitades), 2'5 mg (div. en cuartos) ó 5 mg (div. en cuartos). Caja de 10 blísteres con 10 comp./blister.
- Registro:
  1'25 mg Reg: 3361 ESP.
  2'5 mg Reg: 3362 ESP.
  5 mg Reg: 3363 ESP.

# Dermatología. Gama terapéutica

## Dermocanis® Alercure

- Contiene proteínas y ácidos grasos poliinsaturados.
- Champú antipruriginoso, hidratante, acondicionador y limpiador.
- 2 baños/semana hasta desaparición signos cutáneos.
- Vía tópica.
- Frasco de 250 ml.
- Reg: 11058.

## Dermocanis® Sebocure

- Ácido Salicílico 2%, Azufre (coloidal) 2%, Extracto de Salix alba 3%.
- Champú queratolítico, queratoplástico, desengrasante y humectante.
- 2 baños/semana hasta desaparición signos cutáneos.
- Vía tópica.
- Frasco de 250 ml.
- Reg: 11072.

# Dermatología. Suplemento oral

## Dermocanis® Alerdrops

- Ácidos grasos esenciales (G.L.A, L.A) y vitamina E.
- Piel seca, Dermatitis alérgica, Dermatosis, Seborrea, Alergias, Eccema y Prurito.
- Dosis:
  Perros: 0'5-3 ml/día
  Gatos: 1-2 ml/día
- Vía oral.
- Envase con 60 ml y dosificador.
- Reg: 13302-CAT.

## Dermocanis® Alercaps

- Ácidos grasos esenciales (G.L.A, L.A) y vitamina E.
- Piel seca, Dermatitis alérgica, Dermatosis, Seborrea, Alergias, Eccema y Prurito.
- Dosis: 1 cápsula/10 kg.
- Vía oral.
- Envase con 30 cápsulas.
- Reg: 13301-CAT.

# Dermatología. Gama fisiológica

## Dermocanis® Pelo Corto

- Tensoactivos
- Champú fisiológico para perros de pelo corto.
- Contiene tensoactivos.
- Uso regular según necesidad.
- Vía tópica
- Envase de 250 ml
- Reg.: 11057

## Dermocanis® Pelo Largo Espeso

- Tensoactivos
- Champú Fisiológico para perros de pelo largo espeso
- Según necesidad
- Vía tópica
- Envase de 250 ml
- Reg.: 11076

## Dermocanis® Pelo Largo Liso

- Tensoactivos
- Champú Fisiológico para perros de pelo largo liso
- Según necesidad
- Vía tópica
- Envase de 250 ml
- Reg.: 11077

## Dermocanis® Uso Frecuente

- Tensoactivos
- Champú Fisiológico para uso frecuente en perros de todas las razas
- Según necesidad
- Vía tópica
- Envase de 250 ml y 5 l
- Reg.: 11169

# Sistema Nervioso

## Phenoleptil®

- Fenobarbital 25 ó 100 mg
- Comprimidos palatables smart-tab (divisibles en 2 o 4 partes iguales)
- Prevención de ataques debidos a epilepsia generalizada en perros.
- Dosis:
  25 mg: Perros de 2'5 a 10 kg
  100 mg: Perros de más de 10 kg
- Vía oral.
- Envases de 100 comprimidos.
  Caja de 10 blísteres con 10 comprimidos/blister.
- Registro:
  25 mg Reg: 2790 ESP.
  100 mg Reg: 2791 ESP.

## Canergy®

- Propentofilina 100 mg.
- Comprimidos, divisibles en mitades o cuartos.
- Para la mejora de la circulación periférica vascular periférica y cerebral.
  Para la mejora del embotamiento mental, el letargo y la conducta en general de los perros.
- Vía oral.
- Dosis: 3-5 mg/kg/12h (equiv aprox a 1 compr./ 25-33 kg/12h.
- Envases de 60 comprimidos (6 blisters de 10 compr).
- Reg: 3259 ESP

# Prevención y tratamiento de las hemorragias

## Hemo® 141

- Etamsilato 125 mg/ml
- Prevención y tratamiento de las hemorragias
- Dosis: 0,1 ml/Kg p.c (12,5 mg/kg) repetible cada 6 horas si procede
- Vía IV o IM
- Estuche con 5 viales de 20 ml
- Reg: 0457 ESP

# Biológicos

## Maxivac® Prima DP

- Virus del Moquillo Canino atenuado cepa Lederle ≥ $10^5$ $DICT_{50}$, Parvovirus canino atenuado cepa C-780916 ≥ $10^7$ $DICT_{50}$.
- Perros. Prevención de la Parvovirosis y el Moquillo.
- Dosis de 1 ml/perro.
- Vía subcutánea.
- Caja 10 dosis.
- Reg: 1404 ESP.

## Maxivac® Parvo

- Parvovirus canino atenuado cepa C-780916 ≥ $10^7$ $DICT_{50}$.
- Perros: Prevención de la Parvovirosis, a partir de las 8 semanas de edad.
- Dosis de 1 ml/perro.
- Vía subcutánea.
- Caja 10 dosis.
- Reg: 1301 ESP.

## Maxivac® Penta

- Parvovirus canino atenuado cepa C-780916 ≥ $10^6$ $DICT_{50}$, Virus del Moquillo Canino atenuado cepa Lederle ≥ $10^4$ $DICT_{50}$, Adenovirus Canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan ≥ $10^4$ $DICT_{50}$, *Leptospira icterohaemorrhagiae* inactivada ≥ $10^9$ microorg, *Leptospira canicola* inactivada ≥ $10^9$ microorg.
- Perros: Prevención de la Parvovirosis, Moquillo, Hepatitis infecciosa, Laringotraqueítis (producida por el Adenovirus tipo 2) y Leptospirosis (*L. icterohaemorrhagiae y L. canicola*), a partir de las 8 semanas de edad.
- Dosis de 1 ml/perro.
- Vía subcutánea.
- Caja 10 dosis.
- Reg: 1405 ESP.

## Maxivac® Hepta

- Parvovirus canino atenuado cepa C-780916 ≥ $10^6$ $DICT_{50}$, Virus del Moquillo Canino atenuado cepa Lederle ≥ $10^4$ $DICT_{50}$, Adenovirus Canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan ≥ $10^4$ $DICT_{50}$, Virus Parainfluenza canina atenuado cepa penn 103/70 ≥ $10^5$ $DICT_{50}$, *Leptospira icterohaemorrhagiae* inactivada ≥ $10^9$ microorg, *Leptospira canicola* inactivada ≥ $10^9$ microorg.
- Perros: Vacuna mixta CPV, CDV, CAV-2, CPIV y Leptospirosis canina.
- Dosis de 1 ml/perro.
- Vía subcutánea.
- Caja 10 dosis.
- Reg: 1509 ESP.

## Etadex®

- Vacuna inactivada compuesta por virus de la rabia, cepa Flury LEP, multiplicado en células BHK-21.
- Vacuna inactivada antirrábica.
- Dosis de 1 ml/perro.
- A partir de las 12 semanas de edad
- Vía subcutánea.
- Caja 20 dosis.
- Reg: 10130.

# Higiene Bucal

## Orozyme® Gel

- Complejo enzimático LPO patentado (amilasa, glucosidasa, tiocianato potásico, lactoferrina, lactoperoxidasa, lisozima, superóxido dismutasa), abrasivos suaves, surfactantes no iónicos, saborizantes.
- Higiene dental diaria. Previene la formación de la placa dental.
- Dosis: Una vez al día. Gatos 1 cm, perros 1-5 cm. O bien 1-2 veces/ sem combinando con tiras Orozyme.
- Gel dentífrico, vía bucal.
- Tubo de gel de 70 g + cepillo dedal.
- Registro: 03097-H.

## Orozyme® Tiras

- Láminas de colágeno recubiertas con lactoferrina y lactoperoxidasa (componentes esenciales del complejo enzimático LPO).
- Previene la formación de placa dental y refuerza las encías.
- Dosis: Una cada al día, o alternando con gel dentífrico Orozyme.
- Tiras masticables, vía bucal.
- Tiras:
  "S" < 10 kg (224 g)
  "M" 10-30 kg (141g)
  "L" > 30 kg (141 g).
- Registro:
  "S": 03098-H
  "M": 03099-H
  "L": 03100-H.

# Condroprotectores

## Cosequin® Taste DS Plus

- Glucosamina HCl, Condroitín sulfato, Metilsulfonilmetano (MSM), Hialuronato sódico (HA), Manganeso (sulfato de).
- Suplemento para la protección de las articulaciones.
- Periodo inicial 4-6 sem: 0,5 a 3 compr/día.
  Mantenimiento mitad dosis o días alternos. 1 compr / 7 kg.
- Comprimidos vía oral.
- Estuches de 40, 120, 250 y 496 comprimidos.

## Cosequin® Gatos

- Glucosamina HCl, Condroitín sulfato, Manganeso (sulfato de).
- Suplemento para la protección de las articulaciones (problemas articulares debido a edad avanzada, tras cirugía articular o alteraciones articulares postraumáticas).
- Periodo inicial 4-6 sem: 1 a 2 cápsulas/día. 1 cápsula / 4'5 kg.
  Mantenimiento mitad dosis o días alternos.
- Cápsulas vía oral.
- Estuches de 45 cápsulas palatables (3 blisters x 15 cápsulas).

# NOTAS

# NOTAS

# NOTAS

# Vademécum
# 2018

18SP015

FSC
www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C079342

ecuphar®